

COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA DI SONDRIO

GALLO FORCELLO - Risultati dei censimenti tardo-estivi 2016

| Denominazione area | LIVRIO – MERIGGIO | S. STEFANO GRIONI | CANALE M. ROLLA | ACQUAN. | TOTALE |
|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Superficie censita Ha | 616 | 567 | 409 | 304 | 1896 |
| Femmine adulte sole | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| Femmine ad. con covata | 5 | 7 | 6 | 4 | 22 |
| Gruppi di giovani | 6+4+4+5+3 | 5+3+4+2+2+ 4+3 | 4+3+4+3+5+4 | 2+2+2+4 | 78 |
| Gruppi di giovani | | | | | |
| Indeterminati giovani totali | 22 | 23 | 23 | 10 | 78 |
| TOTALI PARZIALI | 29 | 34 | 31 | 16 | 110 |
| Giovani/FF tot. = S.R. | 3,14 | 2,09 | 2,88 | 1,67 | 2,44 |
| Giovani/covata | 4,40 | 3,29 | 3,83 | 2,50 | 3,55 |
| Densità autunnale/100 Ha | | | | | 5,80 |
| Densità giovani/100 Ha | | | | | 4,11 |

Proiezione delle consistenze e piani di prelievo 2016

| COMPENSORIO OMOGENEO | OROBICO | RETICO | TOTALE | OROBICO | RETICO |
|---|---------|--------|--------|---------|--------|
| Superficie dell'habitat Ha (1/3 VALORE P.F.V.2007) | 6117 | 7618 | 13735 | 18356 | 22850 |
| Giovani stimati | 252 | 313 | 565 | 755 | 940 |
| Covate | 71 | 88 | 159 | 213 | 265 |
| Maschi ad Visti in primavera sulle arene visitate 50% | 74 | 83 | 157 | 74 | 83 |
| Maschi ad. stimati in PRIMAVERA | 109 | 120 | 229 | 109 | 120 |
| Maschi totali | 235 | 277 | 512 | 487 | 590 |
| PRELIEVO POTENZIALE (20%) | 47 | 55 | 102 | 97 | 118 |
| PRELIEVO PROPOSTO | 23 | 27 | 50 | | |

La proiezione elaborata sull'estensione dell'habitat riportato nel Piano Faunistico-Venatorio 2007 (e bozza 2015), è sovrastimata. Il prelievo, in un'annata indubbiamente discreta, secondo questo Comitato di Gestione, applicando i valori indicati dal P.F.V., risulta del tutto improponibile per una buona gestione (dati di prelievo evidenziati in azzurro). E' opportuno che si provveda pertanto a un ricalcolo dei valori degli areali vocati per tale specie, peraltro si procede alla formulazione d'ipotesi di prelievo utilizzando 1/3 dei valori indicati nel piano faunistico.

I risultati dei censimenti primaverili ottenuti da 21 arene su 57 nelle Retiche e da 22 su 43 arene sulle Orobiche, sono stati significativi.

I risultati del censimento estivo nelle aree campione, hanno evidenziato un numero di giovani discreto; ciò deriva dal numero medio di giovani per covata pari a 3,55

Sono state inoltre individuate altre covate in aree censite: in zona Musella (Retiche) 3 covate, per un totale di 10 giovani e sul versante Orobico (Scais Venina e Val Madre) 6 covate per un totale giovani 24. Questi dati non sono stati conteggiati nell' ipotesi di prelievo, ma confermano l'andamento della specie.

Sulla base dei dati rilevati, si può procedere alla formulazione di ipotesi di prelievo.

In considerazione della qualità dell'area censita e dei dati emersi, si intende consolidare il trend positivo riscontrato negli ultimi anni nel territorio del Compensorio, considerando anche il dato di S.R. corrispondente al $N_{\text{Juv}}/FF_{\text{tot}} = 2,44$ che consentirebbe, secondo le indicazioni del PFV, prelievi corrispondenti al 20%, si ritiene che il successo riproduttivo della stagione 2016 sia discreto. Pertanto si propone il prelievo contenuto di 50 capi che corrisponde al 10% del prelievo potenziale con l'intento di mantenere un buon contingente per le stagioni successive.